

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient! Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Apotheker, Arzt oder Therapeuten.



## **Gebrauchsinformation**

# **Autologon intens C12 Globuli**

Streukügelchen zum Einnehmen

Homöopathisches Arzneimittel

### **Zusammensetzung**

1 gr Streukügelchen Autologon Intens C12 enthält  
Arzneilich wirksamer Bestandteil: Eigenblut Dil. C12 1gr

### **Hersteller**

Meister-Erwin-Apotheke  
Steinbacher Str. 35  
76534 Baden-Baden  
[www.autologon.eu](http://www.autologon.eu)

### **Anwendungsgebiet**

Individuell hergestelltes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

*Was sollten Sie bei einer Selbstbehandlung beachten?*

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### **Gegenanzeigen**

*Wann dürfen Sie Autologon intens Globuli nicht anwenden?*  
Bisher sind keine Anwendungsbeschränkungen bekannt.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*  
Wie alle Arzneimittel sollte auch Autologon intens Globuli in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise**

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von Autologon intens Globuli sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich..

### **Wechselwirkung mit anderen Mitteln**

*Welche anderen Medikamente beeinflussen die Wirkung von Autologon intens Globuli? Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?*

Eine Beeinflussung der Wirkung von Autologon intens Globuli durch andere Arzneimittel ist bisher nicht bekannt.

*Allgemeiner Hinweis:* Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt oder Therapeut Autologon intens Globuli nicht anders verordnet hat.

*Wie viel sollten Sie von Autologon intens Globuli einnehmen und wie oft sollten Sie es anwenden?*

Sie sollten die Streukügelchen eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen einnehmen und sie vorzugsweise vor dem Schlucken einige Zeit im Mund behalten.

*Wie lange sollten Sie Autologon intens Globuli einnehmen?*

Setzen Sie die Behandlung in der fünften bis achten Woche fort mit Autologon Intens Globuli C12 und nehmen Sie zweimal pro Woche 5 Streukügelchen. Entnehmen Sie am Ende der siebten Woche eine Blutprobe und senden Sie diese in die Meister-Erwin-Apotheke zur Herstellung der Fortsetzungsbehandlung.

### **Nebenwirkungen**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Autologon intens Globuli auftreten?*

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

*Hinweis:* Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt oder Apotheker befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt, Therapeuten oder Apotheker mit.

### **Hinweise und Angaben zu Haltbarkeit dieses Arzneimittels**

Das Verfallsdatum ist auf dem Behältnis angegeben. Bitte verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum. Homöopathische Arzneimittel können in ihrer Wirksamkeit durch starke elektromagnetische Strahlung (z.B. Röntgenstrahlung) oder magnetische Felder beeinträchtigt werden. Bewahren Sie dieses

Arzneimittel daher nicht in der Nähe starker Magnete oder elektrischer Felder auf.

Arzneimittel sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Darreichungsform und Packungsgrößen  
Originalpackung mit 1 gr Streukügelchen

Apothekenpflichtig