

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient! Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Apotheker, Arzt oder Therapeuten.



Gebrauchsinformation

Autologon intens C12 Lösung

Flüssige Verdünnung zum Einnehmen

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung

1 ml Flüssige Verdünnung Autologon Intens C12 enthält Arzneilich wirksamer Bestandteil: Eigenblut Dil. C12 1ml
5 ml flüssige Verdünnung

Hersteller

Meister-Erwin-Apotheke
Steinbacher Str. 35
76534 Baden-Baden
www.autologon.eu

Anwendungsgebiet

Individuell hergestelltes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Was sollten Sie bei einer Selbstbehandlung beachten?

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Autologon intens Lösung nicht anwenden?

Autologon intens Lösung ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.

Wann dürfen Sie Autologon intens Lösung erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll Autologon intens Lösung bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte auch wegen des Alkoholgehaltes Autologon intens Lösung nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Aufgrund des Alkoholgehaltes sollte Autologon intens Lösung bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von Autologon intens Lösung sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Hinweis: Enthält 43 Vol.-% Alkohol.

Wechselwirkung mit anderen Mitteln

Welche anderen Medikamente beeinflussen die Wirkung von Autologon intens Lösung? Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?

Eine Beeinflussung der Wirkung von Autologon intens Lösung durch andere Arzneimittel ist bisher nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt oder Therapeut Autologon intens Lösung nicht anders verordnet hat.

Wie viel sollten Sie von Autologon intens Lösung einnehmen und wie oft sollten Sie es anwenden?

Sie sollten die Tropfen eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen einnehmen und sie vorzugsweise vor dem Schlucken einige Zeit im Mund behalten.

Wie lange sollten Sie Autologon intens Lösung einnehmen?

Setzen Sie die Behandlung in der fünften bis achten Woche fort mit Autologon Intens flüssig C12 und nehmen Sie zweimal pro Woche 5 Tropfen. Entnehmen Sie am Ende der siebten Woche eine Blutprobe und senden Sie diese in die Meister-Erwin-Apotheke zur Herstellung der Fortsetzungsbehandlung.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was müssen Sie beachten, wenn Sie Autologon intens Lösung in zu großen Mengen angewendet haben (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Inhalts von Autologon intens Lösung werden 1,7 g Alkohol aufgenommen.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Autologon intens Lösung auftreten?

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt oder Apotheker befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt, Therapeuten oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zu Haltbarkeit dieses Arzneimittels

Das Verfallsdatum ist auf dem Behältnis angegeben. Bitte verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum. Homöopathische Arzneimittel können in ihrer Wirksamkeit durch starke elektromagnetische Strahlung (z.B. Röntgenstrahlung) oder magnetische Felder beeinträchtigt werden. Bewahren Sie dieses Arzneimittel daher nicht in der Nähe starker Magnete oder elektrischer Felder auf.

Arzneimittel sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Darreichungsform und Packungsgrößen
Originalpackung mit 5 ml Flüssiger Verdünnung

Apothekenpflichtig